

Observatoire Faune Dégâts du Morbihan


Etats des populations, des prélèvements et des dégâts
des espèces du groupe 3
(sanglier, lapin, pigeon ramier)

Mars 2020

Sanglier



Evolution des prélèvements sangliers



Sanglier




Détail de l'indemnisation des dégâts


Comptes annuels - Exercice 2018 - 2019

Type de cultures	2018/2019	Nbre de dossiers	Ex. précédent	Nbre de dossiers
<u>Grandes cultures</u> (Céréales, maïs, colza...)	157 548 €	269	48 030 €	81
<u>Prairies</u> (remise en état, récolte de foin)	36 170 €	68	27 767 €	77
<u>Cultures spécialisées</u> (maraîchères, légumières, fruitières, florales...)	12 625 €	5	6 539 €	9
Total	206 343 €	342	82 336 €	167


Sanglier



- Des **prélèvements** (enquête annuelle chasse à tir): 16 400 en 2018 2019




NOMBRE DE DOSSIERS DEGATS DEPOSES PAR COMMUNE



- 22 attestations dégâts en 2019
- Demande de classement **NUISIBLE** sur les communes de :
BANGOR, LOCMARIA, LE PALAIS, SAUZON, ILE AUX MOINES,
ILE D'ARZ, ILE D'HOUAT, LES FORGES


AU PRINTEMPS

- L'absence d'une réelle tendance depuis 1996 se confirme pour le Pigeon colombin. Son abondance reste cependant mal estimée.
- Pigeon ramier, espèce toujours en forte progression.



Evolution de l'indice d'abondance du Pigeon ramier à l'échelle nationale.

- **Pigeon ramier**, *Columba palumbus* : 2017 voit une légère augmentation de l'abondance du Pigeon ramier en France. Cette espèce affiche une impressionnante régularité dans l'accroissement de son abondance (+ 107,24 %** depuis 1996). En moyenne, le rythme de croissance s'établit aux alentours de + 3,53 % par an.




Cartographie de l'abondance locale du Pigeon ramier - printemps 2017.




Pigeon ramier

EN HIVERNAGE



Evolution de l'indice d'abondance du Pigeon ramier à l'échelle nationale en janvier.


- Pigeon ramier, *Columba palumbus*** : l'abondance des hivernants témoigne de fortes fluctuations d'une année sur l'autre, traduisant la plasticité somme toute importante, de la fréquentation hivernale de notre pays par cet oiseau. On retrouve en janvier 2017 un indice d'abondance en forte hausse proche de 2011 et de 2013. Cette augmentation de l'abondance pourrait être liée à une arrivée plus importante d'hivernants en réponse aux températures particulièrement plus froide observées en Europe. Avec un accroissement interannuel de + 3,10 % en moyenne, l'abondance de l'espèce en hiver enregistre une augmentation de + 67,65 %** sur les 18 années de suivi.



Cartographie de l'abondance locale du Pigeon ramier - janvier 2017.

Pigeon ramier

PRELEVEMENTS EN MORBIHAN



DEGATS AGRICOLES EN MORBIHAN

- 56 attestations dégâts retournées en 2019, 8 en 2018, 30 en 2017
- De réels problèmes sur le terrain (continent et îles)

GESTION

- Souhait FDC56 de reconduction du classement nuisibles pour 2020 / 2021, dans les mêmes conditions :
 - Sur les cultures à fortes valeurs ajoutées (pois et chou de consommation humaine) sur le continent;
 - et sur céréales, colza et protéagineux sur les îles morbihannaises.